
レーバン®G

ローション

〈痔疾用外用薬〉

第2類医薬品



〔使用上の注意〕

「相談すること」

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感

(2) 10日間位使用しても症状がよくなる場合

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PS



レーベン®G ローション

ローションタイプ

〔成分・分量〕100ml中

ベンザルコニウム塩化物…… 0.05g
プロカイン塩酸塩…………… 0.1g
ナファゾリン塩酸塩…………… 0.05g
クロルフェニルミンマレイン酸塩… 0.05g
ベンジルアルコール…………… 0.5g
添加物としてポリオキシエチレンラウ
リルエーテル、ハッカ油、プロピレン
グリコール、香料を含有します。

〔効能・効果〕

肛門部・外陰部のそう痒症・肛門周
囲炎・いぼ痔・きれ痔・脱肛・肛門
の裂創

〔用法・用量〕

脱脂綿またはガーゼに本液を浸し
て、1日数回患部を清拭するか、ま
たはあん法してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉
肛門部及び外陰部にのみ使用して
ください。

第2類医薬品 100ml



発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度
☎0120-149-931